


» አንዱ አስፈላጊ የኮቪድ-19 ወረርሽኝ የሚቀንስበት ስትራቴጂ ወደ ቤት የሚወሰዱ የኮቪድ ፈጣን መመርመሪያዎችን መጠቀም ነው።

የሞንትጎመሪ ካውንቲ ተብሊክ ስኩልስ (MCPS) በሚቀጥሉት ሁለት ወራት በቤት ውስጥ የሚጠቀሙባቸውን ፈጣን የአፍንጫ (ፈሳሽ) የኮቪድ መመርመሪያዎችን ለማከፋፈል አቅዷል።

- » በእያንዳንዱ እሽግ ውስጥ ሁለት መመርመሪያዎች ይገኛሉ።
- » በቤት ውስጥ የሚደረጉት ምርመራዎች በ 15 ደቂቃ ውጤት የሚሰጡ ፈጣን የኮቪድ-19 አንቲጅን ያላቸው ሲሆን አንድ ግለሰብ የሕመም ምልክቶች እያጋጠመው እንደሆነ ወይም እንዳልሆነ መጠቀም ይችላሉ።



ተማሪ

- » አንድ ተማሪ በኮቪድ-19 መያዙን ከተረጋገጠ ሰው ጋር የቅርብ ንክኪ ያደረገ(ች) ከሆነ—ከተጋለጠ(ች)በት 5 ቀናት በኋላ ፈጣን ምርመራ ማድረግ ያስፈልጋል።
- » ያልተከተበ(ች) ተማሪ ኳራንቲን ሲቆይ/ስትቆይ—በ 6ኛው ቀን ወደ ትምህርት ቤት ከመመለሱ(ሷ) በፊት በ 5ኛው ቀን ፈጣን ምርመራ ማድረግ ያስፈልጋል።
- » አንድ ተማሪ የኮቪድ-19 ምልክቶች ሲያጋጥሙ ወይም ሲያጋጥማት—ምልክቶቹ እንደጀመሩ ወዲያውኑ ፈጣን ምርመራ ማድረግ ያስፈልጋል።
- » ከጉዞ ወይም ከትልቅ ስብሰባዎች መልስ—ወደ ትምህርት ቤት ከመመለሳችሁ በፊት ፈጣን ምርመራ ማድረግ ያስፈልጋል።

ሠራተኛ

- » የሰራተኛ አባል የምርመራ ውጤት ፖዚቲቭ ሆኖ ከተገኘ—ከኳራንቲን በኋላ ከ 6ኛው ቀን በፊት ራስን ማግለል ያበቃ እንደሆነ ለማረጋገጥ በ 5ኛው ቀን ፈጣን ምርመራ መውሰድ ያስፈልጋል።
- » የሰራተኛ አባል የኮቪድ-19 ምልክቶች ሲያጋጥም—ምልክቶቹ ሲጀምሩ ወዲያውኑ ፈጣን ምርመራ መውሰድ ያስፈልጋል።
- » የሰራተኛ አባል በቅርብ ጊዜ ንክኪ ምክንያት ኳራንቲን ሲሆን—ከ6ኛው ቀን በፊት ኳራንቲን ሊያበቃ ይችላል እንደሆነ ለማረጋገጥ ከኳራንቲ በኋላ በ 5ኛው ቀን ፈጣን ምርመራ ማድረግ ያስፈልጋል።
- » ከጉዞ ወይም ከትልቅ ስብሰባ መልስ—ወደ ትምህርት ቤት ከመመለሳችሁ በፊት ፈጣን ምርመራ ያድርጉ።

የኮቪድ-19 ምርመራ ውጤት እንዴት በይነመረብ ላይ ማስተላለፍ እንደሚቻል

እንዲሁም የሪፖርት ማቅረቢያ ቅጹን እርስዎ በሚጠቀሙበት ስማርት ዲቫይስ ላይ ለመጫን ከዚህ በታች ያለውን የ QR ኮድ መጠቀም ይችላሉ።

ደረጃ 1

የኮቪድ-19 ሪፖርት ማቅረቢያ ቅጽ ላይ ጠቅ ያድርጉ bit.ly/MCPS-Reporting-Form

ደረጃ 2

የምርመራ ውጤቱን ሪፖርት ለማቅረብ ቅጹን ይሙሉ

ደረጃ 3

አማራጭ:- በምርመራ ውጤቱ ላይ የሚታየውን ይግለጹ።

